


때갈이 좋아지는 내부구충제

펜벤졸



조달청 식별번호 23155778

1kg

■원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)

[유효성분] 펜벤다졸(Fenbendazole, 별규) 40g

[부형제] 탄산칼슘(Calcium carbonate, 별규) 옥수수전분(Corn starch, KP)

■효능 및 효과

아래 축종의 기생충 구제
가. 소

학 명	기생충명
<i>Haemonchu spp.</i>	염전위충속
<i>Ostertagia ostertagi</i>	소갈색위충
<i>Cooperia oncophora</i>	가시쿠퍼위충
<i>Cooperia punctata</i>	반점쿠퍼위충
<i>Nematodirus helvetianus</i>	헬베티아세경모양선충
<i>Bunostomum phlebotomum</i>	소구충
<i>Trichuris discolor</i>	소편충
<i>Strongyloides papillosus</i>	유두분선충
<i>Dictyocaulus viviparus</i>	소폐충

나. 양, 염소

학 명	기생충명
<i>Haemonchus contortus</i>	염전위충

다. 돼지

학 명	기생충명
<i>Ascaris suum</i>	돼지회충
<i>Strongyloides ransomi</i>	돼지분선충
<i>Oesophagostomum dentatum</i> <i>O. quadrispinulatum</i>	돼지장결절충
<i>Metastrongylus apri</i>	돼지폐충
<i>Metastrongylus pudendotectus</i>	숨은음낭돼지폐충
<i>Trichuris suis</i>	돼지편충

라. 말

학 명	기생충명
<i>Cyathostominae</i>	컵모양입선충
<i>Parascaris equorum</i>	말회충

마. 개

학 명	기생충명
<i>Ancylostoma caninum</i>	개구충
<i>Toxocara canis</i>	개회충
<i>Toxascaris leonina</i>	사자회충

바. 고양이

학 명	기생충명
<i>Toxocara cati</i>	고양이회충
<i>Taenia taeniaeformis</i>	고양이촌충
<i>Ancylostoma tubaeforme</i>	고양이구충

■용법 및 용량

가. 소, 양, 염소 : 체중 kg당 본제 125mg(펜벤다졸로서 5mg)을 혼합하여 1일 1회 경구투여 하십시오.

나. 돼지 : 체중 kg당 본제 125mg(펜벤다졸로서 5mg)을 혼합하여 1일 1회 3일간 경구투여 하십시오.

다. 말 : 체중 kg당 본제 187.5mg(펜벤다졸로서 7.5mg)을 혼합하여 1일 1회 경구투여 하십시오.

라. 개, 고양이 : 체중 kg당 본제 1.25g(펜벤다졸로서 50mg)을 혼합하여 1일 1회 3일간 경구투여 하십시오.

■저장방법 및 사용기간

가. 저장방법 : 실온(1~30℃)에 보관(기밀용기)하십시오.

나. 사용기간 : 제조일로부터 24개월

■주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 마십시오.

본 약제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 동물에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용 : 과량투여 하거나 과민반응으로 인해 구토 및 어지러운 증상이 나타날 수 있습니다.

다. 상호작용 : Dibromsalane, Tribromsalane 등) 제제와 동시에 투여하지 마십시오.

라. 임신, 수유축, 신생축, 어린가축, 쇠악축 등에 대한 투여

임신축에는 수의사의 지시에 따라 신중하게 사용하십시오.

마. 적용상의 주의 : 사료에 혼합하여 투여할 경우 균질하게 혼합되지 않으면 약화사고를 초래하거나 투여 목적을 달성할 수 없으므로 골고루 잘 혼합하여 사용하십시오.

바. 휴약기간 : - 소, 돼지 : 14일 - 양, 염소 : 91일 - 말 : 20일
- 우유 : 4일 - 양유, 염소유(산양유) : 35일

사. 저장상의 주의사항

1. 안전사고 예방을 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
2. 유효성 및 안정성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오.
3. 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
4. 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하고 남은 것은 본래 포장용기를 밀봉하여 습기와 광선이 차단된 장소에 보관하십시오.
5. 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

[권고사항]

1. 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
2. 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
3. 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
4. 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확인되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
5. 오남용 및 내성출현 예방을 위하여 동물용의약품의 사용내역을 빠짐없이 기록하여 주십시오.
6. 오남용에 의한 약화사고 및 축산식품에의 잔류 등을 초래할 수 있으므로 정해진 용법 및 용량을 준수하십시오.
7. 본제를 투여하면서 동시에 동일성분의 약품을 중복투여하지 마십시오.
8. 휴약기간을 준수하지 않을 경우 동물의 체내에 약물이 잔류될 수 있으므로 시간까지 정확히 계산하여 준수하십시오.
9. 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호 장구를 착용하여 직접적인 피부접촉이나 호흡을 피하십시오.
10. 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉된 경우에는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
11. 제품에 대하여 문의하실 사항이 있는 경우에는 제조사로 연락하여 주십시오.



충남 예산군 신암면 추사로 235-9
영업부:(031)478-5560(대표)

