내부 교육용 자료
㈜고려비엔피의 홈페이지 및 제공되는 공개자료는 네이버에서 제공하는 '나눔글꼴'을 이용하여 제작되었습니다.

암프로스액을 이용한 콕시듐 컨트롤 사례

1. ㅎ 농장

- 위치:경북 의성군 소재
- 육계:10만수규모

- 콕시듐발병시기
  :육계 23일령 폐사시작(일/100수)
- 2일/300수, 암프로스 투약
- 방법:음수T/1,250ML,
  48시간 무소등급여
- 경과:폐사2일,오전급여→오후 폐사감소
  이틀째 폐사 멈춤.

2. ㅊ 농장

- 위치:충북 영동소재
- 산란계:12만수규모

- 발병시기
  산란중추 24일령 하단에서 폐사관찰
- 일부 대장균증 폐사 관찰
- 우선 암프로스액 투약음수t/1.5L첨가
- 풀 점등 2.5일 급여 콕시듐 폐사진정
- 환기불량으로 대장균 폐사시작
- (카프란 주사수/0.3ml주사).

3. ㅊ 농장

- 위치:의성군 안평면소재
- 육계:20만수규모

- 발병시기: 22일령 혈변 및 폐사
- 암프로스액 음수t/1.5L 2.5일투여
- 폐사 멈춤.
- 과거 B사 제품 사용(Toltrazuril)
- 효과 떨어져 암프로스 처방.
- 효과만족

최근 필드 상황

- 육계 및 산란계 콕시듐 만연
- 원인:
  - 사료내 항콕시듐제 무첨가
    (최근 항 콕시듐제 첨가)
  - 저가치료제 난무 효과 ⇩
  - 내성 ⇧
  - 고가로 전환 및 치료제 물색
- 백신접종 고려
  - 산란종계 접종고려 및 시도
  - 기타지역 상황 (공유)