

# 바이러스에 강한 소독제 라이프자켓

# 1kg

## ■ 원료약품 및 분량 (본제 1kg 당)

### [유효성분]

- 모노퍼설페이트칼륨 화합물(Potassium Monopersulphate Triple Salt, 별규) ----- 500g
- 이염화이소시아놀산나트륨(Sodium Dichloroisocyanurate, 별규) -- 50g
- [첨가제]** - 설파믹산(Sulfamic Acid, 별규)
- 헥사메타인산나트륨(Sodium Hexametaphosphate (별규)
- 도데실벤젠설포나트륨(Sodium Dodecylbenzene Sulphonate (별규)
- 식용색소 적색 제2호(Food Red No. 2, 식품첨가물공전)
- 레몬향 (Lemon fragrance, 별규)

## ■ 효능 및 효과

### 가. 본제에 감수성이 있는 병인체의 살멸 및 소독

- 1) 세균 : 일반세균(살모넬라 콜레라수이스), 부루셀라, 연쇄상 구균
- 2) 바이러스 : 구제역 바이러스(FMD virus), 돼지열병 바이러스(Classical Swine Fever virus), 돼지생식기호흡기증후군 바이러스(PRRS virus), 뉴캐슬병 바이러스(ND virus), 조류 인플루엔자 바이러스(AI virus), 조류 뉴모 바이러스(APV), 봉입체성간염 바이러스(IBH virus), 아프리카 돼지열병 바이러스(ASF virus)
- 3) 농장이나 부화장, 도축장, 축산물판매장, 수술실, 축사의 살균 및 소독

## ■ 용법 및 용량

- 적정 비율대로 미지근한 물로 희석하여 잘 섞은 뒤 모든 표면과 바닥에 분무 하십시오.

- 5) 착유기, 급수탱크, 급수관, 급이기 등을 소독하는 경우 반드시 물로 충분히 세척하여 잔류되지 않도록 하십시오.

### [취급자에 대한 주의사항]

- 1) 소독작업 시에는 반드시 호흡보호구(방진 또는 방독마스크 등), 보호안경, 보호장갑, 보호복 등 개인보호장구를 착용하십시오.
- 2) 환기에 주의하여 밀폐된 장소에서 사용하지 말고 장시간(2시간 이상)에 걸쳐 연속 작업을 피하십시오.
- 3) 소독작업 후에는 반드시 비누와 물로 손과 몸을 씻고 충분히 양치하십시오.

### [자연환경에 대한 주의사항]

- 1) 소독제 또는 소독액이 각종 수원(식수원, 농업수원 등), 양어장, 양식장, 하천, 전담 등으로 직접 유입되지 않도록 하십시오.
- 2) 소독액 사용 후 남거나 저류된 폐액은 지방자치단체 조례에 따라 처리하십시오(회수폐기 하거나 반드시 충분히 희석 또는 중화하여 방출 하시기 바랍니다).

### 다. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이와 동물의 접근이 불가능한 그늘진 곳에 보관하십시오.
- 2) 개봉 후 기밀이 빨리 사용하고 남은 것은 밀폐하여 본제의 저장방법에 따라 보관하십시오.
- 3) 다 쓴 용기 또는 포장지는 환경에 노출되지 않도록 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 4) 금속용기에는 소독액을 2시간 이상 넣어두지 마십시오.
- 5) 오용 및 품질저하 방지를 위하여 공급된 용기나 포장지 이외에 다른 용기에 소분하여 보관하지 마십시오.

## 권장희석배수

소독대상	대상질병명		일반세균	특정세균		특정바이러스							
			<i>Salmonella choleraesuis</i>	<i>Brucella ovis</i>	<i>Streptococcus suis</i>	구제역	돼지열병	돼지생식기호흡기증후군	뉴캐슬	조류인플루엔자	조류뉴모	봉입체성간염	아프리카돼지열병
유기물이 적은 소독대상	축사공간 및 기구 등	일반세균 + 특정병원체	2,000배	3,600배	13,500배	1,300배	2,500배	2,500배	2,000배	2,000배	600배	1,000배	100배
유기물이 많은 소독대상	축사바닥, 오물, 사체, 농장차량 및 운반용구 등	일반세균 + 특정병원체	110배	2,200배	2,700배		150배	150배	150배	250배	100배	100배	

※ 단, 여러질병에 대해 동시에 소독할 경우에는 가장 낮은 희석배수(고농도)로 사용하십시오.

## ■ 저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 40℃ 이하의 건조한 장소에 보관 하십시오.
- 유효기간 : 제조일로부터 24개월

## ■ 주의사항

### 가. 금기사항

- 1) 가축에 살포하지 말고 가축의 사료 및 음수등에도 노출되지 않도록 하십시오.

### 나. 적용상의 주의사항

#### [제품 사용시 주의사항]

- 1) 소독제를 희석하는 경우에는 가급적 당일에 사용하십시오.
- 2) 유기물질(가축의 배설물 등)이 있는 경우 소독효과가 떨어질 수 있으므로 소독작업은 최대한 청소, 세척 후 실시 하십시오.
- 3) 축사공간 분무 소독 시에는 반드시 빈축사에 사용하고 권장희석배수를 준수하여 실시하십시오.
- 4) 소독작업시 철(연철), 아연(함석, 황동), 주석 등의 금속기구를 부식시킬 수 있으므로 유의 하십시오.

### 라. 상호작용

- 1) 약효 및 안전상에 문제가 발생할 수 있으므로 다른 제품과는 절대 혼합하여 사용하지 말고 다른 제품이 혼합되지 않도록 주의하십시오.

### 마. 일반적 주의사항(응급조치)

- 1) 소독제 및 소독액이 피부, 눈, 음식물, 식품 및 어린이 장난감 등에 직접 닿지 않도록 하십시오.
- 2) 피부나 눈에 묻었을 경우 즉시 흐르는 물로 충분히 씻어내고 이상증상이 있을 경우 의료기관을 방문하여 의사의 처치를 받으십시오.
- 3) 흡입하거나 삼켰을 경우 즉시 응급조치를 취하고 의료기관을 방문하여 의사의 처치를 받으십시오.
- 4) 과민증 등으로 이상반응이 있을때 즉시 제품의 취급을 중단하십시오.

### 바. 기타 주의사항

- 1) 사용설명서의 주의사항에 따라 사용하십시오.
- 2) 수의사의 지시에 따라 사용하고 사용내역을 기록하십시오.

**KBNP** 고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9  
영업부:(031)478-5560(대표)

