



돈호방 돼지열병(마커)·돼지단독복합생백신주

■원료약품 및 분량(본제 1두분 중)

[유효성분] - 돼지열병 생 마커 바이러스(Fic-LOM BE^{MS})
 ----- 10^{3.5}TCID₅₀ 이상
 - 돼지단독균(NL-11) ----- 4 x 10⁸CFU 이상
[첨가제] - TPGG(부기)

■제형 및 색상

가. 제형: 생물학적 제제
나. 색상: 미색 또는 유백색의 건조괴로 이물 및 이취가 없고, 용해용 증류수에 신속히 용해되며, 소분된 내용물의 성상이 균질하여야 한다.

■효능 및 효과

돼지열병 및 돼지단독을 예방할 목적으로 하며, 돼지열병의 경우 아외주와 감별이 가능하다.

■용법 및 용량

가. 접종시기

- 1) 자돈: 55~70일령 1회 접종, 단 추가접종을 원할 경우 생후 40일(5~6주령)째 1차 접종을 하고, 생후 60일(8~9주령)째에 2차 접종하십시오.
- 2) 모돈: 종부 2~4주전 접종하십시오.
- 3) 웅돈: 매년 1회 접종하십시오.

나. 접종방법: 동봉한 화석액을 규정량 주입하여 희석한 후, 이근부 근육으로 1ml 접종하십시오.

■저장방법 및 유효기간

가. 저장방법: 2~8℃에 보관(밀봉용기)하십시오.

나. 유효기간: 제조일로부터 24개월

■주의사항

가. 부작용

- 1) 개체에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 허탈, 피부발진, 구토, 경련 등의 과민반응이 일어날 수 있으므로 주사 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 과민반응 시에는 충분한 마사지와 해독제로 에피네프린 투여가 권장되므로 수의사와 상담하여 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 접종 부위에 화농 등 부작용이 발생할 수 있으므로 지장된 접종경로를 통해 주사 하십시오.

나. 금기사항

다음 환축에게는 투여하지 마십시오.

- 1) 임신중에는 접종하지 마십시오.
- 2) 열이 있거나 영양장애가 심한 돼지에는 사용하지 마십시오.
- 3) 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 돼지, 곰팡이독소(아플라톡신) 및 세균의 독소(대장균 및 살모넬라 독소) 등에 의해 면역기능이 저하된 돼지에는 사용하지 마십시오.
- 4) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 돼지에는 사용하지 마십시오.
- 5) 백신 접종 전후 7일간은 돼지단독균에 영향을 미칠 수 있는 항생물질 사용을 중지하십시오.

다. 사용 시 주의사항

- 1) 본제의 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 2) 지장된 가축에만 사용 하십시오. 또한 접종 가축과 다른 축종의 동물은 접촉하지 않도록 주의 하십시오.
- 3) 수의사의 지시에 따라 사용 하십시오.
- 4) 오·남용은 각종 약화사고 및 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 정하여진 용법·용량대로 사용 하십시오.
- 5) 본제를 투여하면서 동시에 동물성분의 약품을 중복 투여하지 마십시오.

■포장단위

5두/병, 10두/병, 20두/병, 25두/병, 50두/병

- 6) 다른 백신 혹은 약제와 혼합하는 경우 상호 간섭현상, 침전 및 이물형성 등이 나타 날 수 있으므로 절대 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 7) 사용 할 때 마다 충분히 흔들여 사용 하십시오.
- 8) 접종 전 백신의 상상을 관찰하고 이상이 발견되면 사용하지 마십시오.
- 9) 장거리 수송, 신규구입, 사료교체 등의 환경변화에 의한 스트레스를 받았을 경우 정상상태로 회복될 때까지 접종을 삼가 해야 합니다.
- 10) 기생충 감염이 의심될 경우 구충한 후에 건강상태를 보아 접종하십시오.
- 11) 희석된 백신은 직사광선을 피하여 희석 후 즉시 냉암소에 보관하고 가능한 빨리 사용하는 것이 좋습니다.(1시간 내외) 부득이한 경우, 실온(18~23℃)에서는 2시간, 냉장고나 얼음에 보존하였을 경우에도 4시간이상 경과하지 않도록 해야 합니다.
- 12) 백신접종 시 피하지방 조직에 주사하면 면적이 형성되지 않습니다.
- 13) 얼린 주사기와 주사바늘을 사용하고 주사기구나 백신병을 알코올 등의 소독약품으로 소독하지 마시고 주사바늘은 1두 1침을 원칙으로 접종 하십시오.
- 14) 주사부위가 오염된 경우, 주위환경이 불량한 경우에는 주사부위에 염증이 생길 수 있으므로 주사부위를 70% 알코올 등으로 소독 한 후 백신을 접종하십시오.
- 15) 스트레스가 발생하면 접종을 피하시고 접종 최소 1주일 전후에는 스트레스 요인이 발생하지 않도록 주의하십시오.
- 16) 본 제품은 동물전용이므로 사람에게 사용하는 사용하지 마십시오.
- 17) 접종 시기 선정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신 접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록 하십시오.
- 18) 사용 환경 및 개체 차이에 따른 약효에 차이가 있을 수 있으며, 현재 바이러스의 감염, 전파력, 발병력, 면역능력 등에 의해 약효가 차이가 있을 수 있으니 숙지하십시오.
- 19) 개봉한 백신은 개봉 당일 모두 사용하고 사용 후 남은 백신과 빈 용기는 소독 또는 소각하는 등 안전하게 폐기 하십시오.
- 20) 사용 환경 및 개체 차이에 따른 약효 차이가 있을 수 있으니 인지하십시오.

라. 저장상의 주의사항

- 1) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 2) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정해진 저장방법을 준수하십시오.
- 3) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 4) 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

마. 기타 주의 사항

- 1) 접종 시 주사바늘에 찔리지 않도록 주의하십시오.
- 2) 사용자의 부주의로 인해 사람에게 접종 시 즉시 사용 설명서를 지참하여 의사의 진료를 받으십시오.
- 3) 백신 취급 시에는 마스크·장갑·방역복 등을 착용하여 피부에 직접적인 접촉 및 흡입을 피하고 눈·피부 등에 접촉되었을 경우에는 즉시 다량의 깨끗한 물로 씻어낸 후 사용 설명서를 지참하여 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 4) 주사 시 접종동물에 의해 공격당할 수 있으므로 안전사고에 주의하십시오.
- 5) 기타 제품에 대하여 문의 사항이 있는 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.

