

염소 "흔들이"병(Floppy Kid Syndrome)이란?

- ☑ 생후 3~14일령의 새끼 염소에서 주로 발생하며
- ☑ 식욕 부진. 운동 실조. 균형 감각 상실 등의 증상이 나타나면서
- ♥ 24~36시간 후에 폐사하게 되는 새끼 염소의 치명적 질병(치사율 30~50%) 중 하나입니다.




들이" 뚝 / 스탠

스탠드업은 흑염소 새끼들에게 극심한 피해를 주는 '흔들이'를 예방할 수 있는 동물용의약품으로서, 농림수산검역검사본부에서 개발하여 특허 출원된(제 10-2011-0100569호) 효과적인 약제입니다.


스탠드업 투여 후의 혈액학적 변화

대상: 생후 3~10일령, 평균 체중 3~4kg인 흔들이병 염소 8마리 및 정상 염소 7마리

■ pH의 변화



■ 락트산(D-lactate·L-lactate) 변화





탄산수소나트륨(Sodium bicarbonate, KVP 5) ······ 염화나트륨(Sodium chloride, KVP 5)

염소의 전해질 불균형에 의한 흔들이 증상 예방에 도움을 줌

본제를 잘 흔들어서 30ml를 경구로 급여 (6시간 후 상태가 좋아지지 않으면 본제 30ml를 추가로 급여)

- 저장방법: 건냉암소에 보관 유효기간: 제조일로 부터 12개월간

- 휴약기간 : 없음
- 약을 급여하는 동안 우유, 사료의 급여를 중지하십시오.
 사용하기 전에 충분히 흔들어서 사용하십시오.
- 설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오. 정하여진 용법·용량을 준수하십시오. 개봉한 제품은 가능한 한 빨리 사용하십시오.

