

한국형 분무용 ND 백신

힘백 달구방 N901 생백신

■원료 약품 및 분량 (1수분 중)

- 뉴캐슬병 바이러스(NDV, NDRL0901주) ----- 10^{6.0}EID₅₀이상
- TPGG[부기1] ----- 20%
- Gentamicin Sulfate(KVP) ----- 50μg이하

■효능 및 효과

- 뉴캐슬병을 예방할 목적으로 사용한다.

■용법 및 용량

- 1일령에 분무접종하고 방어효율을 높이기 위하여 14일령에 추가 접종을 권장합니다.

가. 분무접종법

- 1) 균일한 입자(60~80μm)가 분무되도록 노즐을 조정한다.
- 2) 계군의 머리 위 50~70cm 높이에서 직접 분무한다.
- 3) 분무 시에는 열풍기와 환풍기 등은 정지시켜 공기의 흐름을 최대한로 막아준다.
- 4) 자동분무 장치를 이용할 때는 그 기계의 사용 설명서에 따라 실시한다.

■포장단위

- 200수분, 500수분, 1,000수분, 2,000수분, 5,000수분

■저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 냉장소(-2~8℃)에 보관, 밀봉용기
- 유효기간 : 제조일로부터 24개월

■주의사항

- 가. 다음환축에게는 투여하지 말 것

- 1) 본제에 대한 쇼크와 과민반응이 있었던 닭에는 사용하지 마십시오.
- 2) 뉴캐슬병에 감염되었거나 잠복 중인 닭, 열이 있거나 영양 장애가 심한 닭, 전염성질병 및 가생충감염, 스트레스를 받은 닭, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 닭에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

- 계군의 위생 상태에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 기침, 재채기, 산란을 저하 등의 접종반응이 일어날 수 있으므로 접종 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 수의사와 상담하여 항생제 및 영양제의 투여 등 적절한 처치를 하십시오.

다. 일반적 주의

- 닭의 모체이행항체수준, 일령, 건강상태, 재접종 등의 조건에 따라 면역형성에 차이가 있으니 이를 고려하여 접종하십시오.

라. 적용상의 주의

- 1) 음수접종 시 급수기 및 급수통을 청결하게 세척한 후 사용하십시오.
- 2) 백신을 희석하는 물은 소독약이나 오염물질이 없는 깨끗한 물을 사용하십시오.
- 3) 백신이 함유된 물을 열이나 직사광선 등에 노출시키지 마십시오.
- 4) 본제는 백신 접종 직전에 용해하며 용해한 백신은 충분히 섞은 후 바로 사용하십시오.
- 5) 접종 전에는 반드시 백신의 성상 및 이물의 혼입여부 등을 관찰한 후 이상이 있으면 사용하지 마십시오.

- 6) 안전성 유효성에 문제를 일으킬 수 있으므로 다른 제제(백신, 항생제, 영양제 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 7) 백신 전 48시간과 백신투여 후 24시간 이내에는 소독제를 투여하지 마십시오.
- 8) 백신 용해된 음수액이 모두 소비되면 소독제가 함유되지 않은 깨끗한 물로 정상적인 급수를 실시하십시오.
- 9) 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주일간은 모든 스트레스 요인으로 부터 보호하여야 합니다.
- 10) 뉴캐슬병 바이러스는 인체에 결막염을 유발할 수 있으므로 눈에 백신이 접촉되지 않도록 주의 하십시오.
- 11) ILT생백신은 1주일, IB생백신은 최소한 2주일 이상 간격을 두고 접종하십시오.

마. 저장상의 주의사항

- 1) 동결되었던 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.
- 2) 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.
- 3) 유효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장방법을 준수하십시오.
- 4) 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.
- 5) 다 쓴 용기가 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

바. 기타 주의사항

- 1) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 2) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 4) 지정된 축종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 5) 접종시기 산정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조 번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 6) 취급자는 장갑, 마스크, 보호의 등 보호장구를 착용하여 직접적인 피부접촉이나 호흡을 피하여 주십시오.
- 7) 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 8) 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 제조사 또는 수입사로 연락하여 주시기 바랍니다.


고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부:(031)478-5560(대표)

