

강력 해열·소염·진통제

덱사포르테 주

처방대상동물용의약품
동물용의약품
휴약기간준수

덱사포르테주는 글루코코르티코이드 스테로이드계의 강력한 합성 호르몬에 속하며 소염제 및 면역억제제로 작용하는 덱사메타손이 주성분인 주사제로 소, 말, 돼지 및 소동물에서 효과적인 소염, 진통 및 항염증 작용을 합니다.

■ 원료 약품 및 분량(본제 1mL 중)

- 덱사메타손 디나트륨 인산염(Disodium dexamethasone phosphate, KVP, 덱사메타손인산염으로서) - 2.00mg

■ 효능 및 효과

- 소, 말, 돼지, 개, 고양이의 부신피질호르몬 적응증의 예방 및 치료 (케토시스, 산전산후의 기립불능, 폐렴, 기관지 염, 결막염, 지궁염, 질염, 관절염, 근염, 알러지성 피부염, 유방염의 경결증상의 와해, 외상, 수술시 쇼크의 원화)

■ 용법 및 용량

- 아래의 용량을 1일 1회, 피하 또는 근육주사합니다.

(1) 소, 말 : 5~10mL

(2) 돼지 : 0.5~2.5mL

(3) 개, 고양이 : 0.5~1mL

■ 저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 실온(1~30°C)에 직사광선을 피하여 보관(기밀용기)

- 유효기간 : 제조일로부터 24개월

■ 사용상 주의사항

가. 금기사항(또는 다음 환자에게 투여하지 마십시오.)

- (1) 심장기능 장애, 신기능 부전 및 영양장애가 있는 동물에게는 사용하지 마십시오.
- (2) 임신 동물에는 사용하지 마십시오.
- (3) 본 약제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 동물에게는 사용하지 마십시오.

나. 일반적 주의사항

(1) 정하여진 용법 및 용량대로 사용 하십시오.

다. 적용상의 주의

- (1) 사용하기 전에 충분히 흔들어서 사용하십시오.
- (2) 멀균된 주사기와 주사바늘을 사용하십시오.
- (3) 주사바늘은 1두 1침을 원칙으로 사용하십시오.

라. 휴약기간

- (1) 도축 전 (소 8일, 말 8일, 돼지 6일) - 고기
- (2) 소 착유전 1일 - 우유

마. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손이 끌지 않고 동물의 접근이 불가능한 건냉암소에 보관하십시오.
- (2) 유효기간이 경과 시, 안전하게 폐기처리 하십시오.

바. 기타

- (1) 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- (2) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- (3) 동물용의약품으로 사람에게는 절대 사용하지 마십시오.
- (4) 지정된 축종 이외에는 안정성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 사용하지 마십시오.
- (5) 남용에 의한 약화사고와 경제적 손실을 초래할 수 있으므로 본제의 정하여진 용법, 용량을 준수하고 본제를 투여하면서 동시에 동일 성분의 약물을 중복 투여하지 마십시오.
- (6) 기타 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.



고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부:(031)478-5560(대표)

www.kbnp.co.kr

4333000
130923



Antipyretic, analgesic anti-inflammatory injection

DexaForte Injection

Veterinary Use Only

DexaForte Injection contains synthetic steroid hormone(dexamethasone), offers enhanced analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effects.

■ COMPOSITION

- Each 1mL contains 2.0mg of Disodium dexamethasone phosphate(as Dexamethasone phosphate)

■ INDICATIONS

- Prevention and treatment of diseases caused by adrenal cortical hormone (Ketosis, astasia, pneumonia, bronchitis, conjunctivitis, uteritis, vaginosis, arthritis, myositis, allergic dermatitis, coagulation in mastitis, swelling, trauma, shock reduction in surgery)

■ DOSAGE AND ADMINISTRATION

- Administer the following dosage once a day intramuscularly or subcutaneously.

1) Cattle or Horse : 5~10mL

2) Pig : 0.5~2.5mL

3) Dog or Cat : 0.5~1mL

■ WITHDRAWAL PERIOD

- For meat : Cattle - 8 days, Horse - 8 days, Pig - 6 days before slaughter

- For milk : 1 day

■ CAUTIONS

- Read the full directions before use.
- Do not use in animal with cardiac insufficiency, renal dysfunction or nutrition disorder.
- Do not use in human.
- Do not use in pregnant animal.
- Use on the order of licensed veterinarian.

■ PACKAGE

- 50ml

KBNP, INC.
235-9 Chusaro, Sinam, Yesan,
Chungnam, Korea
www.kbnp.net

