



돈호방 GMS (지엠에스)

돼지마이코플라즈마·글레서씨균1,4,5형 연쇄상구균 2형 불활화 혼합백신

■ 원료약품 및 분량[1두분(2mL)]

- *Mycoplasma hyopneumoniae* - 2.0~2.4 × 10⁸CCU
- *Streptococcus suis* type 2 - 4.0 × 10⁹CFU
- *Haemophilus parasuis* type 1 - 4.0 × 10⁹CFU
- *Haemophilus parasuis* type 4 - 4.0 × 10⁹CFU
- *Haemophilus parasuis* type 5 - 4.0 × 10⁹CFU
- 수산화알루미늄겔 - 20%(10mg/mL)
- IMS1313 - 10%
- Formalin - 0.2% 이하

■ 효능 및 효과

- 돼지 마이코플라즈마페럼, 글레서씨병, 연쇄상구균 감염증을 예방할 목적으로 사용한다.

■ 용법 및 용량

- 생후 1~2주령에 1.0mL를 이근부 근육에 1차접종하고, 1차접종 2주 후에 2.0mL를 이근부 근육에 접종 한다.

■ 저장방법 및 유효기간

- 직사광선을 피하여 냉장(2~8°C)에 보관, 밀봉용기 - 제조일로부터 24개월

■ 주의사항

가. 다음 환축(돼지)에는 투여하지 말 것

- 1) 열이 있거나 영양장애가 심한 돼지
- 2) 전염병 감염 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 돼지
- 3) 곰팡이 및 세균독소에 의해 면역기능이 저하된 돼지
- 4) 이전에 본 백신에 과민반응이나 쇼크를 일으킨 경험 있는 돼지

나. 부작용

접종 후 개체에 따라서 과민반응이 나타날 수 있으며, 이런 경우 맷사지, 에피네프린 투여가 권장되므로 수의사와 상담하여 적절한 처치를 하십시오.

다. 적용상의 주의사항

- 1) 냉장고에서 바로 꺼내어 접종하면 과민반응이 일어날 수 있으므로 백신의 온도가 상온(15~25°C) 이 될 때까지 놓아 두었다가 충분히 흔들어서 사용하십시오.
- 2) 동결되었던 제품은 효력이 없으므로 사용하지 마십시오.

- 3) 다른 백신 혹은 약제와 혼합하는 경우 침전 및 이물형성이 나타날 수 있으므로 절대 혼합하여 사용하지 마십시오.
 - 4) 사용 후 남은 백신과 빈 용기는 소독 또는 소각하여 안전하게 폐기하십시오.
 - 5) 백신 접종 전에는 반드시 백신의 성상을 관찰하여 이상이 있으면 사용하지 마십시오.
 - 6) 환경이 불량하거나 주사부위가 오염된 경우에는 주사부위에 염증이 생길 수 있으므로 주사부위를 70% 알콜 등으로 소독한 후 접종하십시오.
 - 7) 주사기구는 1회용 또는 물로 끓여 사용하여야 하며, 1두1침을 원칙으로 합니다.
 - 8) 피하접종 시에는 경결 및 화농이 생길 수 있으며 혈관내로 주입시에는 폐사가 일어날 수 있습니다.
- 라. 휴약기간 : 없음.
- 마. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
 - 2) 절대 얼리지 마십시오.
- 바. 기타 주의사항
- 1) 반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

