

아반떼 주

【특장점】

- 제3세대 광범위 항생제로 그람음성균, 그람양성균, 혐기성균에도 강력한 항균력을 나타냅니다.
- 주사 후 즉시 흡수되어 1시간 이내에 혈중 최고농도에 도달되므로 약효가 매우 신속합니다.
- 타 세팔로스포린계열 항생제보다 독성이 현저히 낮습니다.
- 주사 후 24시간 이내에 투여량의 95% 이상이 배설되므로 잔류문제가 없습니다.

【성분 및 함량】 (제품 1g 중)

세프트리오퍼 소디움(별규 1) 1,000mg(역가)

【효능 및 효과】

- 소 : *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus* 등에 의한 호흡기 질병 (수송열, 세균성 폐렴) 및 *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides melaninogenicus*의 2가지 주요 병원성 혐기성균에 의한 급성 기간부란 (부제병, 우상피부염) 치료
- 돼 지 : *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus* 등에 의한 호흡기 질병 (홍막 폐렴, 파스튜렐라성 폐렴, 일반세균성 폐렴) 치료
- 초생추 : 대장균, 살모넬라균 등 주요 세균성 감염증의 예방 및 치료

【용법 및 용량】

- 소 : 본제 1g 당 증류수 20ml에 희석하여 소 체중 50kg 당 1ml를 1일 1회 2~3일간 근육주사 (체중 1kg당 1mg)
- 돼 지 : 본제 1g 당 증류수 20ml에 희석하여 돼지 체중 10kg당 0.6ml를 1일 1회 2~3일간 근육주사 (체중 1kg당 3mg)
- 초생추 : 백신희석액으로 희석하여 백신 주사시 수당 0.08~0.2mg의 투여 용량으로 목부위에 피하주사

【저장방법 및 유효기간】

- 저장방법 : 25℃이하 실온보관
- 유효기간 : 제조일로부터 2년

【주의사항】

- 휴약기간 : 없음
- 사용상 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하여 보관하십시오.
 - 수의사의 처방에 따라 사용하십시오.
 - 증류수에 희석한 제품은 가능한 한 빠른 시간 내 사용하고, 냉장보관하면 7일, 실온(15~30℃)보관시는 12시간 이내에 사용하십시오.
 - 드물게 주사 부위에 일시적인 통증이 나타날 수 있습니다.
 - 본 약제에 대한 과민반응을 보인 동물에는 사용하지 마십시오.

【포장단위】

0.1g 바이알, 1g 바이알, 4g 바이알, 10g 바이알



충남 예산군 신암면 추사로 235-9
 영업부 : (031)478-5560(대표)
 www.kbnp.co.kr

4330010
 121029