

메타플루 30%액

고농도 플로르페니콜 액상 항균제



성분 및 함량 (제품 1L중)

플로르페니콜 300g

효능 및 효과

- 닭: 살모넬라증 및 대장균증의 치료
- 돼지: 홍막폐렴균, 파스튜렐라성 폐렴, 마이코플라즈마성 폐렴 등 호흡기 질환과 살모넬라증, 연쇄상구균증의 치료

용법 및 용량

- 닭 : 물 100L 당 본제 33.34mL의 비율로 음수에 희석하여 5일간 투여, 또는 체중 kg 당 0.067mL (플로르페니콜로서 20mg)를 음수에 첨가하여 5일간 투여
- 돼지: 물 100L 당 본제 33.34mL의 비율로 음수에 희석하여 5일간 투여, 또는 체중 10kg 당 0.34mL (플로르페니콜로서 100mg)를 음수에 첨가하여 5일간 투여

저장방법 직사광선을 피하여 건냉소에 보관

주의사항

- 휴약기간: 닭 - 5일, 돼지 - 16일
- 휴약기간을 준수하십시오.
- 수의사의 처방 및 지시에 따라 사용하십시오.
- 지정된 가축에만 사용하십시오.
- 정하여진 용법 및 용량을 준수하십시오.
- 연속 투약시 항문 부분에 일시적 염증이 일어날 수 있습니다.
- 식용을 목적으로 산란중인 닭에는 사용하지 마십시오.

✓ 뇌, 관절 및 폐에 빠르게 분포하여 즉시 유효혈중 농도에 도달하여 질병을 빠르게 치료합니다.

✓ 고농도 처방제 품목으로 농가에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

✓ 입추 후 광범위 항생제 적용 홍막폐렴 발생 시 적용