

# 뉴캣슬 B1 생백신

## B1 Strain, Freeze dried



### ❖ 성분 및 함량

- 뉴캣슬병 바이러스(NDV, B1주) 감염 장노막강액..... 10<sup>6.0</sup>EID<sub>50</sub>이상
- LPGG 또는 탈지분유(20%)..... 50%
- Penicillin G Potassium ..... 200IU/ml
- Kanamycin sulfate ..... 100µg/ml
- Streptomycin sulfate..... 200µg/ml

### ❖ 효능 및 효과

닭 뉴캣슬병 예방

### ❖ 용법 및 용량

8주령 이하: 닭 1,000수분 당 20L의 물에 희석하여  
음수투여

8주령 이상: 닭 1,000수분 당 40L의 물에 희석하여  
음수투여

### ❖ 저장방법

2~4°C의냉암소에 보관

### ❖ 포장단위

1,000수분/병x10병

### ❖ 주의사항

- 모체이행항체 수준, 일령, 건강상태 및 재접종 상태에 따라 백신 접종 시기를 조정하십시오.
- 열이나 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 백신 전 48시간과 백신투여 후 24시간 이내에는 소독제의 투여를 금지합니다.
- ILT 생백신과는 1주일, IB생건조백신과는 최소한 2주일 이상 간격을 두고 접종하십시오.
- 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.

농림축산검역검사본부(QIA)유래 항원 함유

뉴캣슬병 2차 백신 사용

전 세계적으로 널리 사용하는 NDV B1 스트레인 함유 백신

NDV LaSota 스트레인 대비, 안전성이 높은 생백신

