

부작용이 적고 감별 가능한 단콜마커 생백신

돈호방 돼지열병(마커) 돼지단독 생백신




“항체가 · 야외주 감별 · 생산성,,


“점종 스트레스 · 부작용 · 병원성,,

안전성 SAFETY

1회에 10mL(10배 용량) 접종 후 21일간 임상증상 관찰(모돈/자돈)



항체가 변화 추이(CSFV, 중화항체가, Log2/기하평균)



제품정보 PRODUCT INFORMATION

- 원료약품 및 분량
돼지열병 생마커바이러스 10^{3.5} TCID50/두
돼지단독균 4 x 10⁸ CFU/두
- 효능 및 효과
돼지열병 및 돼지단독을 예방할 목적
돼지열병의 경우, 야외주와 감별이 가능하다.
- 용법 및 용량
자돈 : 55~70일령 1회 접종 또는 40일령 1차, 60일령 2차, 2회 접종
모돈 : 종부 2~4주전 접종
웅돈 : 매년 1회 접종
동봉한 희석액을 규정량 주입하여 희석한 후, 이근부 근육으로 1mL 접종
- 포장단위 : 50두분/50mL
- 저장방법 및 유효기간
2~8℃에 보관
제조일로부터 24개월
- 주의사항
임신돈에는 접종하지 마십시오.
열이 있거나 영양장애가 심한 돼지에는 사용하지 마십시오.
전염성질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 돼지, 곰팡이 독소 및 세균의 독소에 의해 면역이 저하된 돼지에는 사용하지 마십시오.
백신접종 전후 7일간은 돼지단독균에 영향을 미칠 수 있는 항생물질 사용을 중지 하십시오
개체에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 허탈, 피부발진, 구토 경련등의 과민반응이 일어날 수 있으므로 주사 후 과민반응을 잘 관찰하시고 에피네프린을 투여 하십시오.

