

힘백 돼지파보 백신

■원료약품 및 분량 (본제 1두분 중)

- [유효성분] 불활화된 돼지파보바이러스(PPV, PPV-9주) 512 HA unit 이상
- [면역증강제] 수산화알루미늄 겔(Aluminum Hydroxide Gel, 20mg/mL) 10%
- [보존제] 포르말린(Formalin) 0.5% 이하

■제형 및 성상

- 가. 제형 : 생물학적 제제
- 나. 성상 : 유백색의 액으로서 정치하면 상층액은 적황색을 띠나, 진탕하면 쉽게 균등한 액이 됩니다.

■효능 및 효과

- 돼지 파보바이러스 감염증 예방

■용법 및 용량

- 가. 초산돈 : 종부 2-4주 전 두당 5mL씩 근육접종 하십시오.
- 나. 경산돈 : 이유시 두당 본제 2mL씩 보강접종 하십시오.

■저장방법 및 유효기간

- 가. 저장방법 : 2~8℃의 냉장소 보관
- 나. 용기종류 : 밀봉용기
- 다. 유효기간 : 제조일로부터 21개월

■주의사항

가. 다음 환축에게는 투여하지 마십시오.

- 1) 본제에 대한 쇼크나 과민반응이 있었던 돼지에는 사용하지 마십시오.
- 2) 질병에 감염되었거나 잠복중인 돼지, 열이 있거나 영양장애가 심한 돼지, 전염성 질병 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 돼지, 곰팡이 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 돼지에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

돼지의 위생상태에 따라 간혹 백신접종 후에 식욕부진, 허탈, 피부발진, 구토, 경련 등의 접종반응이 일어날 수 있으므로 접종 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 수의사와 상담하여 항생제 및 영양제의 투여 등 적절한 처치를 하십시오.

다. 일반적 주의

- 1) 건강한 돼지에 투여하십시오.
- 2) 정해진 용법·용량을 준수하십시오.

라. 적용상의 주의사항

- 1) 냉장고에서 바로 꺼내어 접종하면 과민반응이 일어날 수 있으므로 백신을 돼지 체온과 비슷한 온도로 가온한 후 사용하십시오.

- 2) 백신접종 전에는 반드시 백신의 성상 및 이를 혼합여부 등을 관찰한 후 이상이 있으면 사용하지 마십시오.
- 3) 얼었다 녹은 제품은 품질 변화 또는 효력이 저하되므로 사용하지 마십시오.
- 4) 다른 제제(백신, 항생제, 영양제 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 5) 개봉한 백신은 개봉 즉시 모두 사용하십시오.
- 6) 접종 후 최소한 3~5일간은 동물이 안정하도록 하십시오.
- 7) 반드시 근육주사 하십시오. 피하 및 혈관내 주입시에는 통증, 종창, 경결 및 쇼크 등이 나타날 수 있습니다.
- 8) 사용할 때마다 충분히 흔들어서 균등하게 한 후 사용하십시오.
- 9) 멸균된 주사기와 주사바늘을 사용하며 1두 1침의 원칙으로 사용하십시오.
- 10) 환경이 불량하거나 주사부위가 오염된 경우에는 주사부위에 염증이 생길 수 있으므로 주사부위를 70% 알코올 등으로 깨끗이 소독한 후 사용하십시오.

【관교사항】

- 1) 본 제품은 동물용의약품이므로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.
- 2) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 3) 사용설명서(주의사항)를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 4) 지정된 동물 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 임의로 사용하지 마십시오.
- 5) 접종시기 선정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종 후 반응 등을 정확히 기록하십시오.
- 6) 취급자는 장갑, 마스크 및 보호의 등 보호 장구를 착용하여 약물의 직접적인 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.
- 7) 약물 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 씻어내고 이상증상이 나타나는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- 8) 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.

■포장단위

10mL, 20mL, 50mL, 100mL

 **고려비엔피**

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부: (031)478-5560(대표)

www.kbnp.co.kr

