

PED SM98P 스트레인 함유 생백신

힘백 돈사방 PED 생백신

■원료약품 및 분량 (1두분 중)

- PED 바이러스(SM98P) ----- 10^{4.5} TCID₅₀이상
- 보호제(TPGG) ----- 20%

■효능 및 효과

- 돼지 유행성설사 바이러스에 의한 설사병을 예방할 목적으로 사용합니다.

■용법 및 용량

- 접종방법 : 동봉된 희석액으로 용해하여, 두당 2mL를 근육주사 하십시오.
- 접종시기 : 임신돈 분만 5~6주 전 1차 접종, 분만 2~3주 전 2차 2.0mL씩 근육주사 하십시오.

■포장단위

- 5두분, 10두분, 20두분

■저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 2~8℃의 냉장상태에서 보관하고, 일광에 노출시키지 마십시오.
- 유효기간 : 제조일로부터 18개월간 유효합니다.

■주의사항

가. 금기사항

다음 돼지에는 접종하지 마십시오.

- 1)열이 있거나 영양장애가 심한 돼지
- 2)전염병 감염 및 기생충 감염, 스트레스를 받은 돼지
- 3)곰팡이 및 세균독소에 의해 면역기능이 저하된 돼지
- 4)이전에 본 백신에 과민반응이나 쇼크를 일으킨 경험이 있는 돼지

나. 부작용

접종 후 개체에 따라서 과민반응이 나타날 수 있으며, 이런 경우 맞사지, 에피네프린 투여가 권장되므로 수의사와 상담하여 적절한 처치를 하십시오.

다. 적용상의 주의

- 1)반드시 건강한 돼지에만 접종하십시오.
- 2)멸균 1회용 주사기를 사용하고 1두 1침을 원칙으로 하십시오.
- 3)다른 백신 혹은 약제와 혼합하는 경우 침전 및 이물 형성이 나타날 수 있으므로 절대 혼합하여 사용하지 마십시오.
- 4)백신은 직사광선을 피하며, 용해 후 즉시 사용 하십시오.
- 5)백신용해 시에는 충분히 흔들어서 완전히 용해한 후 사용하십시오.
- 6)접종부위는 알코올 솜으로 소독건조 후 주사 하십시오.
- 7)백신 접종 2주간은 스트레스를 피하고, 야외 바이러스 노출에 주의 하십시오.

라. 휴약기간 : 없음.

마. 저장 상의 주의사항

- 1)어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 2~8℃의 냉암소에 보관하고, 일광에 노출시키지 마십시오.
- 2)사용 후 남은 백신과 빈 용기는 소독 또는 소각하여 안전하게 폐기하십시오.

바. 기타 주의사항

- 1)사용 전에 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용 하십시오.
- 2)반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 3)동물용의약품이므로 사람에게에는 절대 사용하지 마십시오.
- 4)기타 제품에 대해 문의하실 사항이 있으신 경우 제조사로 연락하여 주시기 바랍니다.



충남 예산군 신암면 추사로 235-9
 영업부:(031)478-5560(대표)
 www.kbnp.co.kr

4544000
 140901

