


**양봉용 동물용의약품**

농림축산검역본부 허가번호 : 제6-329호

꿀벌 노제마병 전문치료제

# 후미달-비 산제(후마길린)

25g



## ■원료약품 및 분량 (본제 1kg 중)

### [유효성분]

- 후마길린(Fumagillin bicyclohexylammonium, 별규) 20.0g(역가)

### [첨가제]

- 폴리에틸렌글리콜 6000(Polyethylene Glycol 6000, KP)
- 인산수소나이트륨(Disodium Phosphate, EP)
- 인산이수소나트륨(Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, EP)

### ■효능 및 효과

- 꿀벌 노제마병(Nosema apis)의 예방과 치료

### ■용법 및 용량

- 가. 봄철 치료 : 노제마(Nosema) 감염시 아래의 방법 중 한가지 방법을 선택하여 투여 하십시오.

- 1) 본제 25g를 아래의 사양수에 희석하여 그 희석액을 8주 동안 매주 아래량을 투여하십시오

소비 매수	사양 수량	희석액 1회 투여량
8매 이상	25L	1L
4~7매	18L	0.75L
3매	12L	0.5L

- 2) 1)의 희석액을 급수기에 넣으십시오.  
(봉군전체를 동시에 치료할 수 있습니다.)
- 3) 1)의 희석액을 소비 및 통 내부에  
분무(충증 감염시)하십시오.

### 나. 가을철 치료

- '가.'의 방법대로 투여하되, 마지막 월동 사양 급여전에 본제가 모두 소비될 수 있도록 일찍 시작하십시오.

### 다. 여왕벌의 사육지와 수경상태에서 사용방법

- 본제 5g을 소량의 물에 용해시켜 Sugar paste (꿀+가루백설탕) 3kg과 혼합하여 투여하십시오.

- 라. 노제마(Nosema) 포자가 소비와 벌통에 남아 있으면 다음해 봄과 여름에 재치료 하십시오.

## ■저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 25°C 이하의 서늘하고 햇빛이 들지 않는 곳에 보관(기밀용기)하십시오.

- 유효기간 : 제조일로부터 24개월

## ■주의사항

### 가. 일반적 주의사항

- 부작용 사고방지를 위하여 용법/용량 및 투여기간을 준수하고 부작용 발생 시 즉시 수의사와 상의하십시오.

### 나. 적용상의 주의

- 유밀기 직전이나 유밀기 중에는 사용하지 마십시오.

### 다. 휴약기간 : 없음

### 라. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 건•냉암소에 보관하십시오.

- 유효기간이 경과 시, 안전하게 폐기하십시오.

### 마. 사용상 참고사항

- 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

- 동물용의약품으로 사람에게는 절대 사용하지 마십시오.

- 기타 문의 사항이 있을 시 제조/판매업자에게 연락하여 주시기 바랍니다.

제조원

고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

판매원

IL/IN 일진에프엔피(주)

강원 영월군 주천면 모내실길 163

대표번호 : 1522-3478