

힘백 계두 백신

본 백신은 계두 약독 바이러스를 SPF 부화계란의 장노막에 접종 증식시킨 후 증식 극기의 장노막을 채취, 보호제로 유제하여 진공 동결 건조한 생독 백신입니다.

■ 원료약품 및 분량(1수분 중)

| | |
|--------------------------|---------------|
| 계두백신 바이러스 감염 장노막 조직액 |30% |
| LPGG 용액 또는 탈지분유(20%)[부기] | |
| |70% |
| 페니실린 |200IU/mL |
| 가나마이신 |100μg/mL |
| 스트렙토마이신 |200μg/mL |

■ 성상

고유의 색조를 띤 건조괴이며, 이물, 이취 및 조대립이 없으며, 희석액을 주입하여 흔들면 내용물의 성상이 균질하여야 합니다.

■ 효능 및 효과

이 백신은 닭 및 칠면조의 계두 예방 목적으로 사용합니다.

■ 용법 및 용량

닭의 날개에 천자법으로 0.01mL씩 접종한다.
(자세한 접종법)

1. 희석용액으로 건조백신을 완전히 용해시킵니다.
2. 희석된 백신액을 계두침에 묻혀서 날개의 익막부 삼각형 중심부에 천자법으로 접종합니다.



(그림참조)

3. 계두침은 6주령 이상에서는 쌍침 그대로 사용하고 6주령 미만일 때는 침 하나를 떼어내고 단침만 사용합니다.
4. 접종 후 약 1주일 후면 접종부위에 발두가 되며 그후 1주일정도 지나면 소실하게 됩니다.
5. 발두가 되지 않는 경우는
 - 1) 개체의 자연면역획득의 경우

2) 백신의 사용상 결함 또는 보관상 결함이 있는 경우

※ 후자(2)에 의한 경우로 추측되면 재접종을 해야 합니다.

6. 접종시기

- 1) 1차 접종은 2~6주령 사이에 하고, 2차 접종은 1차 접종 30일 이후 산란 1개월전 사이에 합니다.
- 2) 산란 기간중에 접종하면 산란물에 영향을 주게 되므로 최소한 산란 시작되기 1개월 전에 접종해야 합니다.

■ 면역기간 및 면역형성

본 백신은 접종 후 3주경에 면역이 형성되며 3~4개월간 면역이 지속됩니다.

■ 저장방법 및 유효기간

가. 저장방법 : 2~4℃의 냉장소에 보관한다.

나. 유효기간 : 제조일로부터 24개월

■ 주의사항

1. 반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
2. 기생충이나 기타 질병에 감염되었을 경우에는 치료 후 본 백신을 접종하십시오.
3. 희석된 백신은 단시간내에 사용하고 시술시 직사광선을 피하십시오.
4. 백신접종자는 일정한 부위에 접종할 수 있도록 고정된 위치에서 시술하십시오.
5. 접종시 사용한 빈병과 기구는 소각 처분하십시오.
6. 진공되지 않은 백신은 사용하지 마십시오.
7. 백신 투여 전 48시간과 투여 후 24시간 이내에는 소독제를 투여하지 마십시오.
8. 피부나 눈에 접촉시에는 물로 깨끗이 씻어낸 후 이상증상이 있을 경우에는 설명서를 지침하여 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

■ 포장단위

· 500수분, 1,000수분

KBNP 고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부:(031)478-5560(대표)

www.kbnp.co.kr

4535000
130201

