

경구용 콕시듐 치료제

톨콕신 5%연탁액



■ 원료약품 및 분량 (본제 1L 중)

- 톨트라주릴(Toltrazuril, 별규 1) - 50.0g

■ 효능 및 효과

- 콕시듐의 감염에 의한 자돈의 설사 예방 및 치료
- 송아지의 콕시듐증 예방 및 치료
- 염소에서 콕시듐증 예방 및 치료

■ 용법 및 용량

- 3~7일령의 자돈에 본제 1mL를 1회 경구투여
- 송아지(5~6주령)는 체중 10kg당 3mL를 1회 경구투여
- 염소에서 체중 kg 당 0.4mL을 1회 경구투여

■ 저장방법 및 유효기간

- 직사광선을 피하여 건조한 곳에 보관
- 제조일로 부터 3년

■ 주의사항

- 휴약기간 : 자돈, 송아지, 염소 - 70일
- 사용설명(주의사항)을 충분히 읽어본 후 사용하십시오.
- 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 기타 자세한 내용은 라벨을 참조 하십시오.



고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부:(031)478-5560(대표)