



백신을 25~30℃ 정도로 따뜻하게 한 후 접종합니다

- ✓ 냉장고에서 바로 꺼내어 접종하면 쇼크, 발열 등 과민반응이 나타날 수 있습니다.
- ✓ 30℃ 정도의 물에 30 분 이상 담구거나 보온등 0.5m 아래에서 약 30 분 이상 가열하는 등 충분히 따뜻하게 한 후 백신을 잘 흔들어서 사용하십시오.

알맞은 주사 바늘을 선택하고 접종 시 주사바늘을 자주 교환합니다.

- ✓ 포유자돈 접종시에 주사 바늘의 길이가 길면 뼈에 닿을 수 있기 때문에 3/4 인치 보다는 1/2 인치를 권장합니다.
- ✓ 모돈은 인근부 지방층이 두껍기 때문에 1½ ~ 1¾인치를 권장합니다.
- ✓ 무더진 주사바늘은 불필요한 상처 및 통증을 유발하고, 주사부위의 농양을 발생시킬 수 있습니다.
- ✓ 주사바늘 교환은 1 복당 1 침을 권장하며, 모돈의 경우에는 반드시 1 두 1 침을 하여 전염성 질병의 전파를 차단해야 합니다.

주사바늘이 직각이 되도록 보정하고, 근육 내에 주사합니다.

- ✓ 사선으로 접종하면 피하·피내 및 지방층에 주사되어 농양이 발생할 수 있습니다.
- ✓ 돼지가 심하게 흔들면 진정한 후에 접종하십시오.

예방적 투여를 권장합니다.

- ✓ 식불·쇼크가 발생할 가능성이 있으면 백신 접종 전날부터 2~3 일간 해열·소염·진통제를 투약하십시오.
 - 사료 톤 당 **카스피린 C** 1.0kg 첨가
- ✓ 주사부위에 부종·농양이 발생한다면 백신접종 전날부터 2~3 일간 항생제를 투약하십시오.
 - 사료(음수)톤 당 **고려 암피실린-100** 1.0kg 첨가

긴급처치

- ✓ 식불이 발생하면 2~3 일간 해열·소염·진통제를 주사하십시오.
 - **막피린 주** 5~10ml
- ✓ 쇼크가 발생하면 따뜻한 곳(보온등 아래)에 놓고 가능한 빨리 에피네프린을 주사하십시오.
- ✓ 설사, 심한 기침, 위축된 돼지 및 쇼크 경험이 있는 돼지에는 접종하지 마십시오.