

힘백 뉴캣슬 B1 생백신

본 백신은 뉴캣슬병 약독 바이러스(B1 strain)를 SPF 밸류계란의 장노막강내에 접종·증식시킨 후 감염극기의 장노막강액을 채취, 특수보호제로 유제하여 진공 동결건조한 생백신입니다.

■ 원료약품 및 분량(본제 1수분 중)

- 뉴캣슬병 바이러스(NDV, B1주)감염 장노막강액 - $10^{6.0}$ EID₅₀ 이상
- LPGG 용액 또는 탈지분유(20%) ----- 50%
- 페니실린 G칼륨(Penicillin G Postassium, KP) ----- 200IU/mL
- 카나마이신황산염(Kanamycin Sulfate, KP) ----- 100µg/mL
- 스트렙토마니신황산염(Streptomycin Sulfate, KP) - 200µg/mL

■ 제형 및 성상

- 생물학적제제, 유백색의 색조를 띤 견조고이며 희석액을 주입하여 훈들면 쉽게 균질한 혼탁액이 됩니다. 이물 및 이취가 없고 소분된 용기간의 성상은 균일하며 pH는 7.0~7.4 이어야 합니다.

■ 효능 및 효과

- 닭 뉴캣슬병의 예방

■ 용법 및 용량

- 8주령 이하 : 닭 1,000수당 20L의 물에 희석하여 음수 투여합니다.
- 8주령 이상 : 닭 1,000수당 40L의 물에 희석하여 음수 투여합니다.

■ 저장방법 및 유효기간

- 냉장보관(2~4°C)에 보관합니다.
- 밀봉용기
- 제조일로부터 24개월

■ 주의사항

- 가. 다음 환경에는 투여하지 말 것

1. 본제에 대한 쇼크과 과민반응이 있었던 닭에는 사용하지 마십시오.
2. 뉴캣슬병에 감염되었거나 감복중인 닭, 열이 있거나 영양장애가 심한 닭, 전염성질병 및 기생충감염, 스트레스를 받은 닭, 공기미 및 세균의 독소 등에 의해 면역기능이 저하된 닭에는 사용하지 마십시오.

나. 부작용

- 계군의 위생상태에 따라 간혹 백신접종 흥에 식욕부진, 기침, 재채기, 산란율 저하 등의 접종반응이 일어날 수 있으므로 접종 후 과민반응의 발현여부를 잘 관찰하시고 수의사와 상담하여 항생제 및 영양제의 투여 등 적절한 처치를 하십시오.

다. 일반적 주의

- 닭의 모체이행체계수준, 일령, 건강상태, 재검증 등의 조건에 따라 면역형성이 차이가 있으니 이를 고려하여 접종하십시오.

라. 적용상의 주의

1. 음수접종 시 급수기 및 급수통을 청결하게 세척한 후 사용하십시오.
2. 백신을 희석하는 물은 소독약이나 오염물질이 없는 깨끗한 물을 사용하십시오.
3. 백신이 함유된 물을 열이나 직사광선 등에 노출시키지 마십시오.
4. 본제는 백신 접종 직전에 용해하여 용해한 백신은 충분히 섞은 후 바로 사용하십시오.
5. 접종 전에는 반드시 백신의 성상 및 이물의 흡입여부 등을 관찰한 후 이상이 있으면 사용하지 마십시오.
6. 안전성 유효성에 문제를 일으킬 수 있으므로 다른 제제(백신, 항생제, 영양제 등)와 혼합하여 사용하지 마십시오.

7. 백신 전 48시간과 백신투여 후 24시간 이내에는 소독제를 투여하지 마십시오.

8. 백신 용해된 음수액이 모두 소비되면 소독제가 함유되지 않은 깨끗한 물로 정성적인 급수를 실시하십시오.

9. 각종 스트레스 요인(환경변화, 사료변경, 수송 등)이 발생하였을 때는 접종을 피하는 것이 좋습니다. 최소한 접종 전 후 1주 일간은 모든 스트레스 요인으로부터 보호하여야 합니다.

10. 뉴캣슬병 바이러스는 인체에 결막염을 유발할 수 있으므로 눈에 백신이 접촉되지 않도록 주의 하십시오.

11. ILT생백신은 1주일, IB생백신은 최소한 2주일 이상 간격을 두고 접종하십시오.

마. 저장장소의 주의사항

1. 동결되었다는 백신은 효력이 없으니 사용하지 마십시오.

2. 안전사고 방지를 위하여 어린이의 손이 닿지 않고 동물의 접근이 불가능한 곳에 보관하십시오.

3. 안효성 및 안전성에 변화를 초래할 수 있으므로 정하여진 저장 방법을 준수하십시오.

4. 유효기간이 경과된 제품은 사용하지 마시고 안전하게 폐기처리 하십시오.

5. 다 쓴 용기나 포장지는 안전하게 폐기하고 다른 용도로 사용하지 마십시오.

바. 기타 주의사항

1. 본 제품은 동물용의약품으로 사람에게 절대 사용하지 마십시오.

2. 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

3. 사용설명서(주의사항)을 충분히 읽어본 후 사용하십시오.

4. 지정된 출종 이외에는 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않을 것으로 의의 사용하지 마십시오.

5. 접종시기 산정 및 만일의 경우를 위하여 사용백신의 제조번호, 유효기간, 구입일, 백신접종일, 접종장소, 접종후 반응 등을 정확히 기록하십시오.

6. 취급자는 장갑, 마스크, 보호의등 보호장구를 착용하여 적절한 피부접촉이나 흡입을 피하여 주십시오.

7. 약품 취급 시 피부나 눈에 접촉되었을 경우는 즉시 깨끗이 씻어 낸 후 이상증상이 발견되는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

8. 제품에 대하여 문의하실 사항이 있으신 경우 제조사 또는 수입사로 연락하여 주시기 바랍니다.

■ 포장단위

- 500수분, 1,000수분 2,000수분, 5000수분, 10,000수분

 고려비엔피

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부:(031)478-5560(대표)

www.kbnp.co.kr