

메타플루 10%액

중쇄지방산이 함유된 플로르페니콜 액상 항균제



성분 및 함량 (제품 1L중)

플로르페니콜 100g

효능 및 효과

- 돼지 : 흉막폐렴균, 파스튜렐라성 폐렴, 마이코플라즈마성 폐렴 등 호흡기 질환과 살모넬라증, 연쇄상구균증의 치료
- 닭 : 대장균증의 치료

용법 및 용량

- 돼지 : 물 1L 당 본제 1.0mL의 비율로 음수에 희석하여 5일간 투여, 또는 체중 10kg 당 1.0mL (플로르페니콜로서 100mg)를 음수에 희석하여 5일간 투여
- 닭 : 물 1L 당 본제 1.0mL의 비율로 음수에 희석하여 5일간 투여, 또는 체중 kg 당 0.2mL (플로르페니콜로서 20mg)를 음수에 희석하여 5일간 투여

저장방법 직사광선을 피하여 건냉소에 보관

주의사항

- 휴약기간: 닭 - 5일, 돼지 - 16일
- 휴약기간을 준수하십시오.
- 수의사의 처방 및 지시에 따라 사용하십시오.
- 지정된 가축에만 사용하십시오.
- 정하여진 용법 및 용량을 준수하십시오.
- 연속 투약시 항문 부분에 일시적 염증이 일어날 수 있습니다.
- 식용을 목적으로 산란중인 닭에는 사용하지 마십시오.



✓ 중쇄지방산과 항균물질의 상승작용으로 향상된 항균 효과를 보입니다.

✓ 뇌, 관절 및 폐에 빠르게 분포하여 즉시 유효혈중 농도에 도달하여 질병을 빠르게 치료합니다.


✓ 특허제법으로 제조 (제10-0645268호)

메타플루 10%액

중쇄지방산이 함유된 플로르페니콜 액상 항균제

빠르게 흡수되어, 질병 전파를 초기에 진압합니다.


혈액내 항생제 농도



PRDC(돼지호흡기질병복합체) 발생 시, 월등한 치료효과

홍막폐렴, 파스튜렐라폐렴, 연쇄상구균증 및 액티노바실러스 수이스 복합감염 돼지 684마리 대상 1kg 당 10mg (음수 1톤에 1L), 5일간 투약 후의 임상증상 및 개선율 비교

침울하지 않은 돼지(%) 호흡곤란이 없는 돼지(%) 기침이 없는 돼지(%)



이유자돈(3~10주령) 글래서씨병 및 연쇄상구균증에도 효과 ↑