

암프로스 액

콕시듐 예방·치료제

암프로스액은 콕시듐치료제로 가장 널리 사용되고 있는 암프롤륨을 주성분으로 하는 제제로서, 특히 액체이기 때문에 약제를 투약하기가 매우 편리하며, 최근에 개발된 콕시백[®] (콕시듐백신)사용시에 백신 접종 효과를 높이기 위해 필수적으로 사용되고 있습니다.



■ 원료약품 및 분량(제품 1L)중 암프<mark>롤륨</mark>(Amprolium, KVP) ··············· 96g

■ 효능 및 효과 닭 및 칠면조의 콕시듐증 예방 및 치료

■ 용법 및 용량

- 콕시듐증의 치료 : 음수 1L당 본제1.25mL를 희석하여
 3-5일간 경구투여
- 콕시듐증의 치료(중증시): 음수 1L당 본제 2.5mL를 희석하여 3~5일간 경구투여, 필요시 음수 1L당 본제 0.6mL를 희석하여 1~2주간 추가로 투여
- 콕시듐백신 접종시 : 콕시듐백신 (콕시백[®])접종 10일
 후에 음수 1L당 본제 0.5~0.6mL를 희석하여 48시간
 동안 투여

■ 포장단위:1L

■ 저장방법 및 유효기간

- 저장방법:5℃이상의 실온에 보관, 밀폐용기
- 유효기간: 제조일로부터 2년

■ 주의사항

- 휴약기간 고기 : 1일
- 용법·용량을 준수하십시오.
- 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 휴약기간을 준수하십시오.
- 산란중인 닭에는 투여하지 마십시오.
- 어린이 손이 미치지 않는 곳에 보관할 것

