

일본뇌염 생백신

본 백신은 일본뇌염 약독바이러스(안양백신주)를 조직배양 세포에 접종·증식후 채취한 바이러스 배양액에 적당량의 보호제를 첨가하여 진공 동결 건조한 생독백신입니다.

■원료약품 및 분량

- 일본뇌염 감염조직 배양액 - $10^{5.0}$ TCID₅₀이상
- TPGG 용액 ----- 20%
- 적정량의 항생제
- Penicillin ----- 200IU/mL
- Kanamycin ----- 100 μ g/mL
- Streptomycin ----- 200 μ g/mL

■성상

- 연한 황백색 색조를 띤 건조괴이며, 희석액을 주입하여 흔들면 쉽게 균질한 혼탁액이 되어야 하고, 이물, 이취가 없으며, 소분용 기간의 성상이 균일하여야 한다.

■효능 및 효과

- 이 백신은 돼지 및 말의 일본뇌염을 예방할 목적으로 사용합니다.

■용법 및 용량

- 돼지 : 3~6월 사이에 4주 간격으로 1mL씩 2회 피하 또는 근육내에 주사합니다.
- 말 : 3~6월 사이에 1회 2mL씩 주사하고, 2개월령의 어린말은 1개월 간격으로 2회 접종합니다.

■저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 2~8℃ 냉장소에 보관하십시오.
- 유효기간 : 제조일로부터 24개월

■주의사항

1. 반드시 건강한 말 및 돼지에 접종하여야 하며 질병의 감염이 의심되거나 영양상태가 좋지 않을 때는 접종을 삼가하십시오.
2. 장거리수송, 신규구입, 사료교체 등의 환경변화에 의한 스트레스를 받았을 경우 정상상태로 회복될 때까지 접종을 삼가하십시오.

3. 희석된 백신은 직사광선을 피하며 실온에서 1시간, 냉장고 또는 얼음에 보존되었을 경우 4시간 이내에 사용하십시오.
4. 본 백신은 생독백신이므로 주사기, 주사바늘 및 고무마개를 알콜 등 소독약품으로 소독하지 마십시오.
5. 멸균 1회용 주사기를 사용하고 1두 1침을 원칙으로 하십시오.
6. 백신용해 시에는 충분히 흔들어서 완전히 용해한 후 사용 하십시오.
7. 백신 접종 2주간은 스트레스를 피하고, 야외 바이러스 노출에 주의 하십시오.
8. 다른 백신 혹은 약제와 혼합하는 경우 침전 및 이물형성이 나타날 수 있으므로 절대 혼합하여 사용하지 마십시오.
9. 본 백신은 열에 약하므로 실온 또는 직사광선하에 방치하여서는 안되며 변색되거나 비진공인 백신은 사용하지 마십시오.
10. 사용 후의 빈병 또는 남은 내용물은 반드시 소각 처분하십시오.
11. 사용 전에 사용설명서를 충분히 숙지 하시고 사용하십시오.
12. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
13. 반드시 수의사의 지시에 따라 사용 하십시오.

■포장단위

- 5두분, 10두분, 20두분

 **고려비엔피**

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부:(031)478-5560(대표)

www.kbnp.co.kr

