

# 타이탄

타이탄은 Butaphosphan을 주성분으로 한 속효성 대사촉진제로 동물의 체내에서 거의 모든 대사과정을 촉진시켜 급만성 질병 및 대사장애, 식욕부진, 비유량 감소에 효과가 있으며 어린 동물의 활력증진 및 질병저항력을 증진시키는데 뛰어난 효력을 발휘하는 제품입니다.

**[성분 및 함량]** 본제 1ml중

부타포스판(Butaphosphan, 별규1) .....	100mg
시아노코발라민(Vitamin B <sub>12</sub> , KP) .....	50μg

**[효능 및 효과]**

본제는 체내에서 거의 모든 대사과정을 촉진시켜주며 다음과 같은 경우에 효과가 있습니다.

- 급성 질병 및 급성 대사장애, 가벼운 마비증, 식욕부진, 비유량 감소, 사역후의 피로회복, 어린 동물의 허약증, 말의 요통, 갈증, 부족 등에 대한 치료시 보조처방
- 만성질환, 만성 대사장애, 어린 동물의 발육부진 및 성장촉진, 허약증, 영양결핍증, 부적절한 사료 급여에 의한 대사장애, 불임증, 기생충 감염시 2차적인 빈혈증
- 건강한 동물의 활력 증진 및 저항력 증진
- 닭: 사료효율개선, 증체 개선(성장촉진), 활력증진, 산란율 및 난각질 개선, 폐사율 감소, 스트레스시 저항력 증진, 카니발리즘 예방, 환유기간 단축

**[용법 및 용량]**

아래 용량을 정맥, 근육 또는 피하주사하며 닭에서는 음수에 희석하여 경구투여

만성질환 및 건강한 동물의 경우 1/2용량으로 1~2주 간격으로 반복 투여

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소(성우): 5.0~25.0ml</li> <li>• 말: 5.0~25.0ml</li> <li>• 돼지(체중에 따라): 2.5~10.0ml</li> <li>• 개(체중에 따라): 0.5~5.0ml</li> <li>• 산란계, 종계: 수당 0.5ml를 2~7일간 투여</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 송아지: 5.0~12.0ml</li> <li>• 망아지: 5.0~12.0ml</li> <li>• 포유자돈: 1.0~2.5ml</li> <li>• 고양이: 0.5~2.5ml</li> <li>• 육계: 수당 0.3ml를 5일간 투여</li> </ul> |
|---|---|

**[저장방법 및 유효기간]**

- 저장방법: 건냉한 장소에 보관
- 유효기간: 제조일로부터 24개월

**[주의 사항]**

- 휴약기간: 없음
- 사용상 주의사항
  - 지정된 동물에만 사용하십시오.
  - 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
  - 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
  - 다른 주사제와 희석하여 사용하지 마십시오.
  - 정맥주사를 할 경우 급하게 주사하는 경우에는 호흡곤란, 오심, 억압 증상이 나타날 수 있으므로 서서히 주입하십시오.
  - 투여하는 동안 동일 성분의 다른 약품을 중복 투여하지 마십시오.
  - 유아 및 소아의 손이나 동물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
  - 남은 약제는 직사일광을 피하여 건조한 장소에 보관하십시오.
  - 품질 보존 및 오용방지를 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
  - 본제의 고무마개를 열거나 주사바늘을 꽂은 채 보관하지 마십시오.

**[포장 단위]**

100ml, 1L

속효성 대사 촉진제

# 타 이 탄 주

타이탄은 Butaphosphan을 주성분으로 한 속효성 대사촉진제로 동물의 체내에서 거의 모든 대사과정을 촉진시켜 급만성 질병 및 대사장애, 식욕부진, 비유량 감소에 효과가 있으며 어린 동물의 활력증진 및 질병저항력을 증진시키는데 뛰어난 효력을 발휘하는 제품입니다.

■원료약품 및 분량 (제품 1mL중)

- 부타포스판 (Butaphosphan, 별규 1) ----- 100mg
- 시아노코발라민(Vitamin B<sub>12</sub>, 약전 VIII) ----- 50μg

■효능 및 효과

- 본제는 체내에서 거의 모든 대사과정을 촉진시켜 주며, 다음과 같은 경우에 효과가 있다.
- 1) 급성 질병 및 급성 대사장애, 가벼운 마비증, 식욕부진, 비유량감소, 사역후의 피로회복, 어린 동물의 허약증, 말의 요통, 갈슘 부족 등에 대한 치료시 보조 처방
  - 2) 만성 질병, 만성 대사장애, 어린 동물의 발육부진 및 성장촉진, 허약증, 영양결핍증, 부적절한 사료급여에 의한 대사장애, 불임증, 기생충 감염시 2차적인 빈혈증
  - 3) 건강한 동물의 활력 증진 및 저항력 증진

■용법 및 용량

- 아래 용량을 경맥, 근육 또는 피하주사 한다.
- 만성질환 및 건강한 동물의 경우 1/2 용량으로 1~2주 간격으로 반복 투여한다.
- 소(성우) : 5.0~25.0mL
  - 말 : 5.0~25.0mL
  - 돼지(체중에 따라) : 2.5~10.0mL
  - 개(체중에 따라) : 0.5~5.0mL
  - 송아지 : 5.0~12.0mL
  - 망아지 : 5.0~12.0mL
  - 포유자돈 : 1.0~2.5mL
  - 고양이 : 0.5~2.5mL

■저장방법 및 유효기간

- 건냉한 장소에 보관
- 제조일로부터 24개월

■주의사항

- 가. 휴약기간 : 없음
- 나. 사용상 주의사항
  - 지정된 동물에만 사용하십시오.
  - 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
  - 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
  - 다른 주사제와 희석하여 사용하지 마십시오.
  - 정맥주사를 할 경우 급하게 주사하는 경우에는 호흡곤란, 오심, 억압 증상이 나타날 수 있으므로 서서히 주입하십시오.
  - 투여하는 동안 동일 성분의 다른 약품을 중복 투여하지 마십시오.
  - 유아 및 소아의 손이나 동물이 닿지않는 곳에 보관하십시오.
  - 남은 약제는 직사일광을 피하여 건조한 장소에 보관하십시오.
  - 품질 보존 및 오용방지를 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
  - 본제의 고무마개를 열거나 주사바늘을 꽂은 채 보관하지 마십시오.



충남 예산군 신암면 추사로 235-9  
 영업부:(031)478-5560(대표)  
 www.kbnp.co.kr

4349005  
 140610

