

힘백 돼지열병·돼지단독 복합백신

본 백신은 조직배양순화 돼지열병 약독바이러스를 건강한 송아지의 신장조직 배양세포에서 증식시킨 배양액과 병원성이 없는 돼지단독균의 배양액에 보호제를 첨가하여 혼합한 후 진공동결 건조한 혼합생 백신입니다.

■원료약품 및 분량(1mL/1두분)

- 돼지열병바이러스 - - - - $10^{3.0}$ TCID₅₀이상
- 돼지단독균 - - - - - 4×10^8 CFU이상
- TPGG 용액[부기 1] - - - - - 20%

■성상

- 희백색의 건조괴로서 희석액에 쉽게 용해되어 균일한 현탁액이 되며 이물 및 이취가 없고 소분된 내용물의 성상이 균일합니다.

■효능 및 효과

- 이 백신은 돼지열병 및 돼지단독의 예방 목적으로 사용합니다.

■용법 및 용량

- 동봉된 희석액[부기 2]으로 희석하여 1mL씩 이근부 또는 대퇴부 근육내에 접종합니다.
 - 1차 접종 : 5~6 주령
 - 2차 접종 : 8~9 주령
 - 3차 접종 : 2 차 접종 6개월 후
- 보강 접종 : 매년 1회
- 면역형성 및 면역기간
본 백신은 접종 2~4주후에 면역이 형성되며 그 후 약 1년간 지속됩니다.

■저장방법 및 유효기간

- 저장방법 : 2~8℃의 냉장소에 보관하고, 열 및 일광에 노출시키지 마십시오.
- 유효기간 : 제조일로부터 24개월간

■주의사항

- 가. 금기사항
 - 1) 백신 접종 전후 7일간은 돼지단독균에 영향을 미칠 수 있는 항생물질 사용을 중지하십시오.
- 나. 사용상 주의사항
 - 1) 본 백신은 고온이나 직사광선에 노출시키거나 얼리지 마십시오.
 - 2) 주사기구나 백신병을 알콜등 소독약품으로 소독하지 마십시오.
 - 3) 본 백신은 일단 개봉한 후에는 즉시 사용하고, 접종후 잔량을 폐기하십시오.
- 다. 기타 주의사항
 - 1) 반드시 건강한 돼지에 접종하여야 하며, 질병의 감염이 의심되거나 영양상태가 좋지 않을 때는 접종을 삼가 하십시오.
 - 2) 장거리 수송, 신규 구입 및 사료 교체 등의 환경변화에 의한 스트레스를 받았을 경우에는 정상상태로 회복된 후 접종하십시오.
 - 3) 교배 2주 이내, 임신말기, 분만직후의 모돈은 접종을 피하십시오.
 - 4) 감수성이 높은 자돈의 경우 간혹 백신 접종 부위에 발적이 일어날 수 있으며 심한 경우 원기소실, 식욕부진, 발열 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
 - 5) 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.

■포장단위

- 10두분/병, 20두분/병

 **고려비엔피**

충남 예산군 신암면 추사로 235-9

영업부:(031)478-5560(대표)

www.kbnp.co.kr

